

## COMMENTAIRE

Monsieur le Rédacteur en Chef,

Suite à la parution de notre article : « Traitement chirurgical de l'insuffisance chronique par stripping de la veine grande saphène sans crossectomie : résultats cliniques et hémodynamiques. » (*Phlébologie* 2007 ; 60 : 223-228), nous tenons à apporter les précisions suivantes :

Le Docteur Paolo Casoni est le premier à avoir travaillé sur ce sujet à Parme où il a mis en place une étude randomisée comparant le stripping de la veine grande saphène avec et sans crossectomie.

Nous n'avons pas fait référence à cette étude dans notre communication car elle n'a pas encore été publiée, le Docteur Casoni ayant souhaité attendre d'avoir les résultats à 5 ans avant de soumettre son travail pour publication.

Cependant, ces résultats à 5 ans ont été rapportés par le Docteur Casoni au dernier Congrès Annuel de l'American College of Phlebology qui s'est tenu à Tucson (Arizona) du 8 au 11 novembre 2007, après la publication de notre article dans *Phlébologie* (juillet-septembre).

Il s'agissait d'une étude randomisée de 124 membres inférieurs (MI) avec 61 MI dans le groupe stripping + crossectomie (groupe A) et 61 MI dans le groupe stripping sans crossectomie (groupe B). Un total de 119 MI ont été revus à 5 ans, avec présence d'un reflux inguinal dans 24 % des cas pour le groupe A et dans 8 % dans le groupe B, et d'une récurrence variqueuse dans 32 % pour le groupe A et dans seulement 11 % pour le groupe B.

Même si cet important travail n'a pas encore été publié, il nous a semblé qu'il était licite d'en rapporter les résultats car le Docteur Casoni a été le premier à lancer une étude prospective randomisée sur le sujet.

En vous remerciant d'avoir accepté de publier ce commentaire.

Bien cordialement.

*Docteurs P. Pittaluga et S. Chastanet.*