Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises

Phlébologie ANNALES VASCULAIRES 2021, 74, 4, p. 34-51

Article original
Original paper

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE Phlébologie

Échographie Doppler sous stimulation pharmacologique pour la DE vasculaire. Standardisation des mesures et recommandations.

Duplex Scan echography under pharmacological stimulation for vascular ED. Standardization and recommendations.

Sussman H., Virag R.

Résumé

L'exploration des dysfonctions érectiles par échodoppler sensibilisé par la stimulation pharmacologique intracaverneuse de l'érection obéit à un protocole strict aujourd'hui standardisé et sécurisé.

Pour évaluer uniquement une atteinte artérielle un minitest avec des doses minimum de papavérine 8 mg ou alprostadil 5 µcg est suffisant.Le maxitest pratiqué avec une injection de 1 ml de papavérine à 40 mg et 20 µcg d'alprostadil, permet une évaluation globale de la capacité érectile et des territoires artériels et veineux.

Les scores artériels et veineux permettent de classer les différentes atteintes suivant leur gravité et de décider de l'imagerie nécessaire et/ou de choisir une thérapeutique adaptée. La spécificité et sensibilité pour l'évaluation veineuse est très élevée.

Précédent l'injection, l'examen des artères caverneuses sur verge flaccide avant et après occlusion du flux artériel explore la fonction endothéliale.

Le risque d'érection prolongée est maîtrisé en raison de la possibilité d'injecter un alpha stimulant si l'érection rigide se maintient.

L'affirmation d'une atteinte artérielle et/ou endothéliale conduit à proposer un examen cardiovasculaire exhaustif car la DE est alors potentiellement prédictive d'AVC et ou d'infarctus du myocarde.

Au total l'échographie doppler est un outil indispensable à l'exploration de toutes les dysfonctions érectiles durables et/ou résistantes au traitement symptomatique.

Mots-clés : *dysfonction érectile, écho-doppler pénien, injection intracaverneuse, dysfonction endothéliale, fuite caverno-veineuse, papavérine, alprostadil, NO, stimulation pharmacologique de l'érection, artères caverneuses, artères pudendales, veine dorsale profonde de la verge, cavernoscanner, angioscanner.*

Abstract

Evaluation of erectile dysfunction through duplex scan ultrasonography with intracavernous pharmacological stimulation obey to a standardized and secured protocol.

To evaluate solely an arterial involvement low dose of papaverine (8mg) or alprostadil (5µcg) is sufficient. To globally evaluate both arterial and venous system as well the erectile capacity a higher dosage is necessary. We recommend a mixture of 20µcg of alprostadil powder diluted in 1 ml (40mg) of papaverine chlorydrate.

Determination of arterial and venous score allow to classify upon severity and decide for further imaging procedures and therapeutical options. Specificity and sensitivity are very high.

Before intracavernous stimulation a shear stress test of the deep arteries evaluates the penile endothelial function.

The risk of prolonged pharmacological induced erection is well controlled by the use, if necessary, of intracavernous injection of alpha stimulant.

When present arterial involvement and/or endothelial dysfunction ask for careful evaluation of other vascular territories knowing that ED is predictive of forthcoming stroke and/or myocardial infarct.

In summary, penile duplex scan under pharmacological stimulation is mandatory to evaluate all permanent or recurrent ED.

Key words: erectile dysfunction, penile duplex scan, penile ultrasonography, intracavernous injection, endothelial dysfunction, caverno-venous leak, papaverine, alprostadil, NO, pharmacological stimulation of erection, deep penile arteries, pudendal arteries, penile deep vein, cavernoscanner, angioscanner.

Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises

Introduction

L'exploration du pénis par échographie doppler, sensibilisée par l'injection intracaverneuse (ED-IIC) de médications vaso-actives est l'élément central de l'évaluation d'une dysfonction érectile (DE).

En effet, cet examen a une valeur diagnostique et pronostique à la fois pour les vaisseaux péniens mais aussi pour l'albuginée, sur le pénis flaccide comme sur la verge en érection.

Le but de cette publication est de montrer l'état de l'art et de proposer des recommandations pour une utilisation homogène et universelle de cette technique incontournable dans la prise en charge des troubles de l'érection.

Compte tenu de l'origine vasculaire prépondérante de l'ensemble des DE, l'apport de la médecine vasculaire est fondamental.

Matériel et Méthodes

Rappel anatomique succinct [1]

Le pénis comporte deux parties, l'une dite pendulaire facilement accessible à l'examen échographique, l'autre profonde, nichée dans le périnée et nécessitant pour être explorée des incidences particulières **(voir ci-dessous anatomie échographique et figures 1 à 4)**.

Il est composé de 2 corps caverneux accolés en canon de fusil, séparé par un septum ajouré et entouré d'une membrane épaisse et extensible nommée albuginée.

Les artères du pénis, deux artères dorsales et deux artères caverneuses sont fournies par les artères pudendales internes branches des artères iliaques internes ipsilatérales. Il existe de nombreuses variations d'origine au niveau l'origine des pudendales internes, des dorsales et/ou des caverneuses.

Signalons l'importance des pudendales externes, branches de l'artère fémorale à son origine, lorsqu'existent des lésions sur les pudendales internes.

Le réseau veineux est complexe fait d'un réseau profond confluent en une veine dorsale profonde (VDP), parfois dédoublée et d'un réseau superficiel (veine dorsale superficielle et veine satellite de chaque artère dorsale); (voir les articles sur le cavernoscanner et la numérisation des veines péniennes) **(Figures 1 et 2)**.

Matériel et réglages

Deux types de sondes sont nécessaire:

- une sonde de basse fréquence (3,5 à 5 MHz) pour l'exploration profonde (gros vaisseaux abdominaux et incidences périnéales)
- et des sondes de haute fréquence (13 à 18 MHz) pour l'exploration du pénis pendulaire.



FIGURE 1 : *Anatomie topographique et échographique (vue latérale longitudinale sonde 6-15 Mhz)*
A. coupe longitudinale montrant en 7 l'artère caverneuse (Kaminka. Tome IV)

Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises



FIGURE 1 : *Anatomie topographique et échographique (vue latérale longitudinale sonde 6-15 Mhz)*
B. position de la sonde pour bien voir l'artère caverneuse
C. la visualisation de l'artère caverneuse et en bleu une branche trans septale

Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises



FIGURE 2 : *Coupe transverse (sonde identique).*
A. coupe anatomique sagittale médio pénienne (Kaminka Tome IV).
B. Position de la sonde.

Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises



FIGURE 2 : *Coupe transverse (sonde identique).*
C.Échographie en coupe médiane.

Il convient d'avoir deux réglages, l'un dédié à la mesure des flux lents, l'autre à vocation tissulaire (albuginée et tissu érectile).

Anatomie échographique

Suivant les sondes et réglages utilisés on obtiendra des vues transverses et longitudinales explorant verge flaccide et rigide sur sa portion pendulaire comme sur sa portion profonde aussi bien les vaisseaux que les structures solides et en particulier l'albuginée [2] **(Figures 1 à 4)**.

Stimulation pharmacologique

Il convient de distinguer deux types de stimulation intracaverneuse: l'une minimale que l'on nomme ***minitest*** qui ne prétend pas provoquer une érection mais qui vise simplement à stimuler l'arrivée artérielle. On peut utiliser :

- **Soit le minitest**
  - **soit l'alprostadil (Edex® 5 mcg),**
  - **soit le chlorhydrate de papavérine 8 mg (laboratoire Aguettant®);**
- **Soit le maxitest.**

C'est une méthode maximaliste puisqu'elle vise à provoquer une érection complète et durable.

- On utilise une médication vasoactive qui donnerait à un sujet normal, avec certitude, une érection rigide et durable :
  - **soit 1 ml de céritine® 2002** [3],
  - **soit un mélange papavérine 40 mg (poudre), alprostadil 10 mcg (1 ml)**.
- Le risque d'érection prolongée extrêmement faible lors du minitest, plus fréquent lors du maxitest.
- Il est géré par l'injection **de 0,6 ml d'étiléfrine® (Laboratoire Serb)** si la détumescence ne commence pas dans la demi-heure qui suit l'injection.
- Très rarement, une deuxième injection et/ou un drainage, peuvent être nécessaires. Ce dernier est réalisé à l'aide d'un Butterfly 28 ou 30 G inséré latéralement dans l'un des deux corps caverneux [4].

Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises



A

B

Fuite par le fond du corps caverneux gauche

C

FIGURE 3 : *L'exploration des troncs veineux profonds : incidence dite d'Hélène 1 (avec sonde de basse fréquence).*
A. Visualisation du tiers fixe périnéal des corps caverneux. Permet de voir les artères caverneuses dans leur trajet profond) et de déceler comme ici une fuite du fond du CC droit).
B. Position recommandée de la sonde.
C. Cavernoscanner confirmant la fuite (voir en annexe la Vidéo).

Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises



FIGURE 4 : *L'exploration des troncs artériels et veineux profonds : incidence dite d'Hélène 2 (avec sonde de basse fréquence en transverse et en longitudinal).*
A. Artère pudendale interne (sonde rétroscrotale en transverse).
B. Fond du CC (sonde rétro scrotale longitudinale) cette incidence permet de visualiser la naissance des artères En A : dorsale et caverneuse de la pudendale interne.

Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises

Méthodologie d'examen

L'examen commence par la réalisation du ***penile NO release test (PNORT)*** [5].

- Il consiste en la mesure de la capacité de dilatation de l'une des deux artères caverneuses après occlusion totale de l'arrivée sanguine pendant 5 minutes.
- La donnée brute est convertie en un indice après application d'un abaque tenant compte de la variabilité du diamètre initial de l'artère caverneuse. *(voir formule du calcul du PNORT en annexe)* [5].
- Lorsqu'existent des facteurs de risque vasculaire et/ou que l'on a constaté une atteinte artérielle distale, on explore l'aorte abdominale et ses branches à l'aide de la sonde profonde, de basse fréquence. (voir ci-dessous).
- Après injection intracaverneuse l'examen se déroule avec un timing précis: de 3 à 5 minutes pour enregistrer les flux des 2 artères caverneuses en longitudinal le plus près possible du pubis et des 2 dorsales en coupe transversale à la base du pénis **(Figures 5 et 6)**.
- La mesure sera répétée sur les artères caverneuses à 10 minutes avec une attention particulière pour la vitesse télédiastolique (VTD) **(Figure 7)**.
- Durant ce laps de temps se déroule l'exploration du fond des CC, de l'aorte abdominale et des axes iliaque avec la sonde de basse fréquence, à la recherche d'atteinte artérielle profonde.
- A partir de 10 minutes la sonde superficielle explore le pénis pendulaire, en coupe transversale sur toute ses faces à la recherche de signaux veineux; la sonde profonde recherche des fuites au niveau de la racine des corps caverneux **(incidence d'Hélène 1 et 2) (Figures 3 et 4)**.
- Quand l'érection est rigide il n'y a pas de fuite caverno-veineuse (FCV) aucun signal veineux n'est perceptible.
- Dans le cas contraire, elles sont localisées **(Figures 8 et 9)** et mesurées. Lorsqu'un flux veineux est constaté dans la VDP on mesure l'influence de la contraction des muscles ischio et bulbo-caverneux **(Figure 10)**. On recherche également une éventuelle fistule caverno-spongieuse.**(Figure 11)**.

Recueil des données :

- La rigidité du pénis atteinte est calculée de 0 (pas de tumescence) à 4 (rigidité complète) déterminant **l'*erection hardness score*** (EHS) [6].
- **Au niveau artériel :** on tient compte de la morphologie des courbes et de la vitesse systolique à 3 minutes sur les artères caverneuses.
- Lors du minitest elle doit être > 35 cms/sec, lors du maxitest > 50 cms/sec. Son abaissement permet de classer les atteintes de 1 à 3 **(Tableau 1)**.
- Quand les artères dorsales sont atteintes on recherche une atteinte sus jacente pudendale interne et/ou iliaque interne.
- **Au niveau veineux :** on va déterminer un score veineux qui tient compte des vitesses moyennes obtenues dans la VDP, la plus fuyante des veines dorsales superficielles (VDS) et la VTD.
- Chaque vitesse enregistrée est notée de 0 à 3 et leur addition constitue le **score veineux (Tableau 2)** : lorsqu'il est > 1, il existe une FCV [6] qui sera confirmée par le cavernoscanner. (Voir l'article consacré à cet examen dans ce numéro).
- **Renseignements additionnels :** l'échographie permet d'évaluer la présence d'une éventuelle maladie de Lapeyronie [2] associée à la DE et découverte à l'occasion de l'examen; elle peut également déceler une fibrose intracaverneuse.

Résultats et recommandations

Les renseignements recueillis sont différents suivant que l'on a effectué un mini ou un maxitest.

Dans les deux cas le PNORT identifie ou non une dysfonction endothéliale (indice < 1,37) qui est d'autant plus sévère que l'indice est plus bas.

- *Le minitest* est un test de dépistage et s'adresse aux patients, avec FRV et vierges de tout traitement. Il est également indiqué pour les patients jeunes (< 40 ans), dont l'histoire clinique évoque une angoisse d'échec prédominante.
- *Le maxitest* est à la fois diagnostique et pronostique. De l'intensité de la réponse se déduit la possibilité d'un traitement médical (EHS < =3) ou la discussion d'un traitement chirurgical (EHS < 3).(voir dans ce numéro *La place de la chirurgie vasculaire dans les troubles de l'érection)*.
- La présence d'un score veineux > 1 orientera vers la pratique d'un cavernoscanner. L'étude comparative des données des deux examens a démontré une spécificité et une sensibilité très élevée de l'ED-IIC dans le diagnostic des FCV.
- Dans tous les cas, mini ou maxitest, l'identification d'une atteinte artérielle pénienne conduit impérativement à un bilan coronaire et carotidien.

Ainsi peut-on dessiner un algorithme décisionnel (Figure 12) issu des résultats du maxitest.

Ce dernier s'impose impérativement chez tous les sujets en échec de traitement médical simple **(iPDE5)** et dans le cas des impuissances primaires suspectes de FCV.

La sécurité du patient impose lors du test une surveillance tensionnelle et de garder le patient jusqu'à la détumescence que celle-ci soit spontanée ou provoquée par **l'IIC d'étiléfrine.**

Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises



A. Tracé normal 3 mn après injection IIC (vitesse systolique ▫ 50 ms).



B. Artère caverneuse gauche.
- **Démodulation**
- **Vitesse ▫ 50 ms**
- **Atteinte modérée**



C. Artère caverneuse droite.
- **Atteinte artérielle sévère**
- **Vitesse ▫ 30 ms**

FIGURE 5 : *Exploration des artères caverneuses lors du maxi-test.*
A. Tracé normal
B. Atteinte caverneuse modérée
C. Atteinte sévère

Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises



FIGURE 6 : *Atteinte artérielle dorsale et pudendale externe lors d'un maxitest.*
A. Artère dorsale gauche démodulée (vitesse systolique 20 cms/sec
B. Artère pudendale externe retrouvée entre Scarpa et région dorsale du pénis, mise en jeu en cas d'occlusion de la pudendale interne.

Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises



A



B

FIGURE 7 : *La Vitesse télédiastolique (VTD) comme indication potentielle de FCV.*
A. 10 mn après l'IIC, la VTD est totalement abolie (onde négative).
B. Même délai persistance d'une vitesse ▫ 5 cms/sec, ici 17.8 cms témoin d'une probable FCV importante.

Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises



FIGURE 8 : *Fuite par la veine dorsale profonde (VDP).*
A. Coupe transversale à la base du pénis pendulaire.
B. Mesure du flux (vitesse moyenne 20 cms/sec.

Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises



FIGURE 9 : *Repérage et mesure des flux dans une veine superficielle droite et la veine dorsale profonde vide. En rouge l'artère dorsale droite. Notez les vitesses moyennes très élevée (▫ 30 cms/sec). Voir le tableau 2.*

Test Score A	Ao	A1	A2	A3
Minitest Papa 8 mg ou PGE1 5 µcg	> 30 cms/sec	20 à 29	10 à 19	< 10
Maxitest Papa 40 mg PGE1 10 µcg	50	30 à 49	20 à 29	< 20

TABLEAU 1 : *Classification de l'atteinte artérielle en fonction de la vitesse systolique sur l'artère caverneuse.*

Ao absence d'atteinte, A1 atteinte légère, A2 atteinte moyenne, A3 atteinte sévère

Papa = chlorhydrate de papavérine ; PGE1 = alprostadil.

Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises



FIGURE 10 : *Influence de la contraction des muscles périnéaux.*
A. La contraction abolit la fuite mais celle-ci augmente à l'arrêt de la manœuvre.
B. Le flux n'est pas totalement aboli.

Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises



FIGURE 11 : *A. Repérage de possibles fuites entre corps caverneux et corps spongieux.*
B. Enregistrement d'un énorme flux (voir les images de cavernoscanner de fistules CC/CS dans ce numéro).

Discussion

L'ED-IIC tel qu'exposé ici, s'impose comme l'examen fondamental de toutes les DE. Certains l'ignorent, d'autres en discutent l'utilité alors que ces avantages sont indiscutables puisqu'il est le seul capable d'orienter le diagnostic vers une cause vasculaire ou non, il est le seul à pouvoir rassurer un patient sur les possibilités d'un traitement d'une affection invalidante et anxiogène (voir dans ce numéro *Le risque vital des troubles de l'érection)*.

On connaît de longue date le lien étroit entre DE et facteurs de risque vasculaire [8].

Il s'y ajoute aujourd'hui un nombre croissant d'études épidémiologiques [9] indiquant que l'existence d'une DE précède de plusieurs années la survenue d'un AVC ou d'un infarctus du myocarde.

Cela a conduit à préconiser une consultation cardiologique à tout sujet de plus de 40 ans présentant une DE, sans examen préalable de ses artères péniennes (consensus de Princeton [10].

Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises